



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



61

Av 6R

99 MICHAEL

LIS HIERONYMI LE

DESMAE, VALENTINI ME

dici, de Pleuritide Com
mentariolus.



VALENTIAE.

Per Ioannem Mey, Flandrum.

1 5 4 6.

SERENISSIMAE PRIN

CIPID. D. MENTIAE A MENDO

ca Duci Calabriae & Zeneteni. Mi-

chael Hieronymus Ledesma

Valesi. medicus S. P. D.



VVM viderem, Princeps Serenissima, medicinarum professores temporum infelicitate solos Forluientes, Senenses, & Fulginates attingere, eosque suis discipulis exponendos tradere, nec vnuquam Galeni Hippocratisve fontes accedere, nisi putrilacunarum cornu infectos: de creui in Reip. vtilitatem, cui & vitam debebam, & animum, Galeni opera in gymnasio publice audientibus, quorum Dei gratia, magnus mihi erat concursus, interpretari. Quo nomine hisce annis, quibus ego hanc provinciam assumpsit, prodire in lucem libri de Affectis locis, de Crisibus, de differentiis febrium, de febribus ad Glauconem, Medendi methodus, & alij non minus utiles, qui antea vel contempti vel incogniti delitescerant. Quumque hisce studiis iam bonarum literarum factio augeri indies magis ac magis videretur, non desuere, qui quotidianam conuictio peteret, ut quaestiones aliquot, in quibus inter autores nostros controuersia est, in methodum quampiam reductas scriptis traderem, quod ipsi in vnaquavis earum quid sentiendum esset, breui quodam compendio tenerent. Quod non sum in aliquibus grauatus facere, inter quas vna pleuritica phlebotomia est. Quae quidem cum meo circumferretur nomine, mendis innumeris plena, manca in plerisque locis, inepta in non paucis, amamentum infelicitia, e re mea esse putavi, ut emendatior auctiorque Typographo traderetur, ac tuo dicatur non mihi, quod a me primitias & Hellenismi & Galenismi simul acciperes, non enim parui refert, quo astro primum nascentes filii excipiantur. Vale, Sophistasque iam ex nostra academia fuga, quos nec ferre possum, nec ipsi me. Valentiae 3 cal. Septembris 1546.

DE PLEVRITIDE

COMMENTARIOLVS, PER MICHAEL

Item Hieronymum Ledesnam Valentinum Me-

dicum,

Præfatio.



Icet ex Galeni dictis intelligam longè difficillimū esse ad ueritatē eos reuocare, qui sectæ se aliquid seruituti addixerūt, q̄ falsæ opinionēs animos hominū præoccupantes, non surdos solum, sed & cæcos faciunt, ita ut uide re nequeant, quæ alijs conspicuè apparent, Non tamen in amicorum & discipulorum gratiam, meam de pleuritide in mediū asserre sententiam grauabor: ut si quid in me est autoritatis, id totū inuenies in credendis commentarioli mei placitis conferāt, multò antea degustantes, quæ salubriora sunt, quàm quæ forsan postmodum, & difficilimè, & cum non mediocri stomachi incōmodo sint euomituri. Alijs sanè res nō scribitur, nam quis si sapiat, à quoquam nisi mediocria audeat exigere? Scio nanq; ex ipso eodem Galeno nullam pertinacius hærente tincturam, quàm quæ ad prauas præceptiones est affectio. Quo nomine qui diuersa sentient, sentiant & nugas esse, quæ scripsi, ut ego aliquando in corū sententijs facere solitus sum.

8. secundū locos.

2. de diff. anhe.

De thoracis anatome.

Ad exactam morbi naturam dignoscendam, affecti

LEDESMA,

de aff. lo. loci rationē habendam esse Galenus asserit, quæ ex ana-
1. cap. 1. tomes pendit peruestigatione. Nam quum intra thoracem partes aliquot sint, quæ affici non raro soleant, ut deanturq; pleuritidum signa, nec tamē sint, cordati est ea omnia ad unum internoscere, ex quibus aliquid obsecuritatis emanare potest, nisi iam Glauconis exemplo deceptus, errorem magni non facias, ut ille adhibito in

De aff. lo. consiliū Galeno fecit multi. Adde quòd ad curationē
4. cap. 7. ipsam non parū faciet uenarū descriptio, quarum ignorantia multos eorum decepit, qui in hoc negotio longē aliter quàm deberent, sentiunt. Intra igitur thoracis spaciū, cor est, pulmo, arteria aortha, uena caua, uena azygos, membrana costas succingens, costæ duodecim, raro enim tredecima uisitur, rarius, sed aliquando tamen, deest duodecima. Duo & uiginti muscoli, supernarum nimirum costarum duo, infernarum duo, à collo manant tres, à dorso septem, per abdomen disseminantur octo, qui omnes ad thoracem spectant, quando eius officio, nempe inspirationi & respirationi seruiunt. Inspirationis nanq; non uiolentæ (nam duæ sunt spirationis species, Galeno autore) causa septū transuersum est, thoracis finis. Violentæ uerò, sima portio musculorum per scapulas disseminatorum, & ultima pars musculorum intercostalium. Expirationis autem non uiolentæ abdominis muscoli, muscoli uerò intercostales extimi, uiolentæ. A clauicula ad septū transuersum

Sum thorax est. Cuius quatuor superiores costas, scæpius, rarius uerò tres, uenulæ diuaticatæ in dextram partem & sinistram nutriūt, è caua uena nimirū dimanantes. Octo autem infernas dextras item & sinistras uena azygos, dextra cordis parte exoriens, in multis elatior, in nonnullis aliquanto inferior cordis auricula, ramus etiam uenæ cauæ ad inferiora remeans. Sed de his Galenus lib. de usu respirationis, & de anatomicis administrationibus, & de partium usu.

De pleuritica inflammatione.

Pleuritis ex Galenicis documentis in Aphorismorū commentarijs inflammatio est membranæ costas succingentis, quod Galenus idem de causis puls. & de aff. loc. apertè demonstrare uisus est. Inflammationē uerò sub tumore præter naturam, tanquam genere cōprehendit lib. de tum. præter naturam. Medici tamen uulgares pleuritidem apostema soliti sunt appellare, quū nil minus pleuritis sit, quàm apostema, præsertim quum nondum suppurata sit. Inquit enim Gal. 2. ad Glauc. ubi iam de inflāmatione cæterisq; tumoribus satis fuisse pertractauit. Enimuero de his satis dictū est, tempus namq; exigit ut transeamus ad abscessuum pertractationem (apostema enim Græcè abscessus est Latine) sic autem nominant eas dispositiones, in quibus inuicem distant, quæ prius se contingebant corpora, spaciū igitur uacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam

6. Aph. 35

cap. 8. &
lib. 5. cap. 2.cap. 2. de
abscess.

LEDESMA,

„ Spirituosam, uel humidam, aut mixtam ex utrisq; com-
 „ præhendit, ad quod ex inflammationibus quædam, atq;
 „ erysipelatis non pauca transmutantur. Sine his etiam
 „ abscessuum dispositio consistit, ex multitudine quorun-
 „ dam humorum, aut spirituum uaporosorum, siue in ipsis
 „ patientibus partibus in medio generentur, aut ex alijs
 „ confluant, ea ratione qua sunt illa, quæ decubitus uo-
 „ cantur. Nominant uerò sic huiusmodi dispositiones, quæ
 „ qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto
 „ ad alterum transmutantur. Quocumq; uero modo fiat
 „ abscessus, id spatium quod abscedentes interiacet par-
 „ tes, humiditatibus, quæ ipsum faciunt, complentur.
 „ Quæ ubi aliquando perdurauerint, plures habent alte-
 „ rationes. Nam & lapidibus, & arenis, & testis, & lig-
 „ nis, & carbonibus, & limo, & sordiciei, balnei feci, si-
 „ ue amurcæ & multis alijs talibus similia in abscessibus
 „ corpora contineri inueniuntur. Hæc ille. Quæ omnia
 „ lib. de Tum. citato confirmare uerbis similibus uisus est.
 „ Illud tamē addit appellari nimirum huiusmodi abscessus
 „ à ueteribus suppurationes, sed eas ibidem Gal. in pecto-
 „ re tantum fieri uult. Species uerò abscessuum meliceri-
 „ des nominat, atheromata, steatomata, & id genus alia:
 „ inflammationum uerò, tumores, erysipelata, scirrhus, &
 „ œdemata. Vnde toto errat celo, qui tumores omnes ap-
 „ pellant apostemata (ut medicorum maior pars facit) atq;
 „ in tumore eo, quem apostema ipsi appellant, tres morbo-

Commu-
 nis error.

DE PLEVRITIDE. 4

rum differentias inueniri sentiunt, distemperiem nimis
rum, uitiatam compositionē, & continui diuortiū. *Quæ* De morb.
tantum Gal. in abscessu inueniri tradit, quū ait. *Quæ* diff. 1.
cunq; pars una cum phlegmone ulcere quoq; infestatur,
triplici morbo affici necesse est. Quam sententiam fal-
so Cauliacus Guido, uir alioqui literatus, de reliquorū
etiam more errauit, apostema sanè idem cum tumore
procuidubio fore autumans. Illud tamen ex Gal. amo-
tandū est, pleuritidem ab affecto loco appellatā, πλευ-
γὰ enim costā est, unde πλευρίτις.

Meth. 2

De diuisiunculis in pleuritide annotandis.

Solet aliquando pleuritis supernas partes infestare,
nonnunquam infernas, ut Hippo. animaduertit. Item 2. de ac.
quedam uera pleuritis est, quedam notba, hæc flatulen 11.
tus est spiritus, aut tumor uersus externa, illa autē in-
flammatiō succingentis membranae, quod annotauit Ar-
chigenes. Adhæc pleuritis, aut afficit latera, aut me-
diastinum, aut diaphragma: quū & in intercostalibus
musculis, Gal. teste, inuenitur. At nullam aliā propriè
appellari uoluit pleuritidem, quā eam, quæ lateris in-
ternam membranam infestat. Illud tamen longè certissi-
mum est, sinistram inflammationem dextra peiorem esse 2. de aff.
ex Rusi sententia, sed utrāq; longe maligniorem, quæ cap. 1.
in diaphragmate fieri solet, ob sextæ syzygiæ diuaria-
tionem eò tendentem. Præterea morbi uis sua tempora
habet concoctionis dicta, quæ breuiora, aut productio

3. de aff. 2

a 4 ra so

LEDESMA,

1. aph. 12. ra solent esse, ut Gal. in Apho. scriptū reliquit. Symptomata etiam sua sortiuntur tempora, Sed tenendū memoria est, concoctione in sputo apparente, symptomatum declinationem incipere, & quò pròptius apparuerit concoctio, promptius cessare symptomata. Quin & pro doloris uolentia fluxu magis aucto, uel minus, longiora etiam esse morbi tempora, uel breuiora. Potest intra diem unum, horasq; pauciores pleuritis ad statū peruenire. Tandem animaduersum à medicis est, pleuritidem, aut discuti, aut in suppurationem uerti, aut in scirrhum, aut in peripneumoniam, aut ad infernas migrare partes, natura suas ad id uias inueniente.

Causæ pleuritidis.

**Cap. pro
prio.**

Quas in uniuersum Gal. inflammationis causas posuit lib. 2. ad Glauconem, easdem esse & pleuritidos sentiet. Sanguinem nempe copiosum, calidiorem æquo ad membranas confluentem. Rarius enim humores alij eam progenerare dicuntur. Bilis tamen aliquando, ut Gal. in Aph. dixit. Item ictus dolore fluxū cōcilians, uini potus sanguinem augens, & inflammans, frigus externū comprimens, & non raro distemperie lædens membra-

6. aph. 34.

nas, Gal. autore, hunc morbum pariunt. Item mensū suppressio, & hæmorrhoidū, ut ait Alexander Trall. Demum sit inflamatio hæc, cæteræq; fluxiones decumbente in membrū humore, imbecillitate sua incommodo ipsi paratijs. De quo negotio fusius Gal. lib. de tum.

3. aph. 23.

& de

Et de plenitudine, nonnihil etiam in arte parua. Cause nothæ pleuritidis flatulentorum usus sunt, potus gelidi, distemperies frigida externi aëris.

Signa.

Signorum aliquot sunt differentiæ, pathognomonica, ætiologica, diastaltica, chronica, epallætica. Pathognomonicorū ratio prima sit, sunt ea quinque; primum ex Gal. febris, quoniam sedes affecta parū à corde distat. Secundum, dolor punctilis, ex eodem Gal. quia in membro admodum sentiente. Tertium, anhelitus difficultas, ex. 2. de dyspnœa, ubi Anaxionis exemplo, eam necessariam esse in pleuritide ob æquo maiore caliditatem sentit. Quartum, tussis, ut ibidem uidere est. sed eam nunc humidam nunc siccam esse ait, certè tamen necessariam, natura nimirum à materia ipsa irritata nocumentū expellere conante. Quintum, inæqualis pulsus est, et durus, membris nimirum duris affectis, et admodum relictantibus, quod Gal. affert lib. de cau. puls. Quod si ad intercostales musculos uerius dolor uergat, pulsus non æquè durus est, quia locus mollior, et dolor pulsatilis, quia in musculosiori parte. Quod Gal. pertrahit lib. de aff. lo. De quibus mox sigillatim agemus post signorum differentias in uniuersum enarratas.

Ætiologica morbi causas ostendunt. Inquit enim Gal. effusa in thoracis spaciū sanies, in asperas arterias recipitur pulmonis, deinde tussiendo excreatur, »

« S qualis »

LEDESMA,

„ qualis sit, qui inflammationem facit humor declarans,
„ an uidelicet sit biliosus, an melancholicus, an pituitosus,
„ an cruentus. Etenim si bilis abundat, flauum aut palli-
„ dum, si atra bilis, atrum, si pituita, spumofum & candi-
„ cans, si sanguis, rubrum. de his etiam in Aphorismo-
6. aph. 36. rum commentarijs.

4. de aff. 7 Sicuti medici apud Galenū exemplū, signa diastal-
tica nos ad ungum tenere cogit. Hepatis enim & lie-
nis inflammationes, & pulmonis etiam, pleuritidi simi-
les esse uidentur affectiones. At in pleuritide dolor ue-
hementior est, quā in hepate, liene, uel pulmone: quia
locus natura membranofior. Pulsus etiā longe durior,
tussisq; multo maior & humidior. Locus item doloris
euariat, nam hypocondria sunt, quæ illæsa in pleuritide
manent, at in reliquis, ea sunt, quæ afficiuntur. In
peripneumonia uerò anterior pars pectoris, scapulæq;
dolent, simul cum angustia, quæ orthopnoeam imitatur.
De quibus Gal. lib. de notis puls. & de aff. lo. 2. cap. 3.

2. cap. Signa chronica ex lib. de crisi sunt decerpenda, totū
enim illud principiū Gal. appellat, in quo sputum non
apparet, apparente uerò, sed tenui, augmentum, quòd
ubi crascescit naturæ lege, uigorem: declinationem ue-
rò ubi iam sputū immittitur. Cruenta, atra, croceaq;
sputamenta, atq; spumosa, quò in candorem æquali cui-
dam substantiæ commixtū uergent, eò magis ad morbi
finem, & proinde ad salutem peruenire dicuntur.

Signa

Signa epallactica, inuenies apud Hippo. illic, *Qui- 5.aph.9*
 cunq; morbo laterali laborantes in quatuordecim die-
 bus nō purgantur, ij in suppurationē uertūtur. Itē ibi, *5.aph.15*
Quicunq; ex morbo laterali suppurantur, si in quadra-
 ginta diebus purgantur à die qua fit eruptio, liberan-
 tur, si uerò non, in tabem transeunt. Quibus uerbis
 Chous permutationū genera complectitur. Quum in
 peripneumoniam uertitur, dignoscitur ex peripneumo-
 nie signis diastalticis allatis, efferendisq; postmodū cap.
 de pulsu Serratili.

De pleuritidis febre.

Licet in prima signorum diuifuncula, de pleuriti-
 dis febre, reliquisq; pathognomonicis signis egerim, nūc
 tamen de eisdem speciatim pertraētandum est, quoniam
 in eorum quouis sunt quedam ignota uulgo, admodum
 aduertenda. Quorum illud primū est, non parū esse ar-
 gutici in febris natura in pleuritide inuenta peruesti-
 ganda. Inquit enim Gal. Febres inflammationibus ad *7.aph.42*
 ueniētes, symptomata potius quā morbos esse, earumq;
 aliquot affert differentias, Lipyriam, Elodem, Tippo-
 dem, pestilentem, ardentemq; quarū lypiriam febrem
 cum Philothco ait esse aduenientem internis aut inflam-
 mationibus, aut Erysypelatis in eo Apho. In febribus *4.ap.48.*
 non intermittētib; si partes exteriores sunt frigide,
 interiores uerò urantur, & sitim habeāt, lethale. Idem
 in Præfagijs confirmat, ea uerba exponens. Si caput,

aut

LEDESMA,

- aut manus, aut pedes, frigidi sunt, uentre costisq; calen-
tibus, malū est. Quod quo fiat modo in eo exponit Apho-
rismo In morbis acutis frigiditas extremarū partium,
malū. confert enim ibi Hipp. inflātionis ardorē, cu-
curbitula ad se sanguinem ē toto corpore trahenti, un-
de extremas partes frigescere necessariū est. Hæc dixe-
rim, tum ut intelligant omnes q; licet ex Gal. sententia
lib. de Crisibus. 2. & de feb. diff. febris pleuritidi ad-
ueniens tertianæ assumat accessiones, nihilominus eam
lipyriam esse, tum ut animaduertant toto eos errare cœ-
lo Arabes, qui Lipyriæ propriam tribuunt materiam,
nunc nimirū pituitam, nunc bilem crassam, locoq; tantū
aiunt ab Hepialo differre. Quū tamē in Hepialo apud
Galenum lib. de inæq. intemp. & de feb. diff. simul fri-
giditatem & febrem membra tum interna, tum exte-
na sentiant. quod præter Gal. decretum suæ anonymæ
Auicenna tribuit & Serapion, quum Rases & Aliabb.
Galenum ad unguem, ut par erat interpretes, sequuti
sint. Illud autē Aëtij lib. 5. cap. 88. lipyriam scilicet esse
quando in uentriculo erisypelas est, typhodem (de qua
Gal. 12. primæ sect. Apho.) quādo in iecore, Crymodem
quando in pulmone, non rectē Fuchsius damnat, nam si
septimæ sect. Aphor. 42. legas, uidebis illud si non ex-
pressisse, certē significare Galenū in cōmentario uoluisse,
dicentem, Accidentariarum febrium autores inuenisse
differentias, ut Hepialon, Lipyriam, Elodem, Typho-
dem

7.apho.1.

2.cap.

Cōmunis
error.

16.cōr.&
7.theo.

Arguitur
Fuchsius.

dem, &c. quæ iecorariæ, pleuriticiæ, uel lienoſæ nunquam ſunt appellatæ. Porro nõ ſic appellari poſſent febres illæ, niſi quia iecoris, lienis uel lateris inflāmationibus ſolerent accidere. Elodes igitur ex Gal. ſententia humida febris eſt, quòd in ea ſudores fiant nõ pauci, quod ſanè poſſet contingere diſcuſſa lienis inflāmati materia. Sic & Crymodes pruinofa febris dicitur, ea nimirũ, quæ pulmonis inflāmato ſolet accidere, quæ inquam ob aëris intercluſionem, languentem ingēti ardore comburere utdeatur. Crediderim ſanè Aëtium Fuchſio & prius & attentius Gal. & dicta & animũ perueſtigaffe, & intellexiſſe. Non dubitans licet lippyria propriè ſtomachi inflāmati febris ſit, eſſe etiã eam lippyriam, in qua refugiente ad interna calore externa augeant, quæ in quauis interioris membri inflāmatione pernicioſa poteſt contingere.

Ad Lycũ.

Defendi-
tur Aëtius

De dolore punctili.

Dolores laterum, & pectoris, & aliarum partium ut ait Hipp. 6. & Apho. & Epid. Si multum differant conſiderandi, perdiſcendum. Nam ſi in ſuperioribus coſtis ſint, uenæ ſectiõne, ſi in inferioribus, pharmaco indigent ex præſagiorũ ſecundo. Item ſi ex bili fiant, uerius potione curantur, quàm miſſione ſanguinis, eodem Choo autore ſexti Epid. ſect. 4. Apho. 32. Adhæc genus doloris animaduertendum, nam in carnoſis partibus, ut lumbis, dolor eſt gravis, in neruoſis punctilis, in artorioſis

Aph. 5. 8c
epid. ſect.
7. aph. 17

aph. 10

LEDESMA,

riosis pulsatilis, in adenibus distendens, in partibus ossium vicinis stimulan, atq; adeò inter ipsa ossa humore aliquo mordaci partes sensiles erodente, in sinibus ut in intestinis, lacerans. Stupida autem Galeno doloris species non est, contra Archigenem, sed duarum rerum doloris quippe & stuporis concursus. Stupor enim dispositionis non loci affecti indictum est. fit namq; ex refrigeratione insigni, aut ex constrictione uehementi, atq; eos etiam, qui torpedinem uiuentem senserunt stupor infestare solet. De his Gal. de aff. lo. 2. Plin. lib. 9. Paulus 2. Aëtius. 5. Præcipit præterea Gal. dolentes ipsos uiticem conferre, Dionem nimirum Theoni: solent enim delicatiores uehementius queri, in quorum numero sunt feminae. Demum ibidem ex duobus ostendit naturam doloris pernosci posse, ex specie quidem eius, & uehementia. Illud nemini non est notum, dolorem aliquando pro affectu, quem parit, capi, ut in Epid. sexto. In Crano ne uetusti dolores frigidi, noui uerò calidi (barbari inceptè hunc locum citant) aliquando pro molesto & laborioso sensu, ut Gal. de sympt. cau. definit. Eius causas Hippocratem posuisse Gal. lib. de in. e. q. intemp. probat dicentem, Dum corrumpitur natura, & alteratur dolores fiunt. Item omnis morbus, dolorificus nimirum, ulcus est. Duas etiam posuisse Gal. clarius est, quàm ut probari debeat, loca sunt multa id ostendit lib. de sympt. caus. citato nuper loco. liber de lo. aff. annotato cap. li-

cap. 1.
cap. 16.
cap. 40.
cap. 400

Sect. 1.
aph. 7.

cap. 5.
cap. 4.

aph. 8.
& 80.

ber

ber artis paruae, liber de uis. ac. com. primo. Methodus
 medendi, lib. 12. & 13. Quo in loco uestigare inquit an cap. 7.
 alteratio sola dolorem pariat citra solutionē, præsens
 negocij non est, quum iam id factum sit lib. de simpl. me- 4. cap. 1.
 di. satq; nunc medico fuerit alterationē solam abijcere.
 In eo tamen lib. Gal. proculdubio doloris proximam cau-
 sam solutionem facit, Hippocratis tum alijs, tum eo di- 4. 20.
 cto rem probans, Frigidum ulceribus mordax, nam fri-
 gidity in ulceribus contractionē pariens dolorem con-
 ciliat, in cute uerò non ulcerata, nihil tale efficiens, non
 conciliat, nisi iam mediocritatē excederet, tunc enim &
 solutionem & dolorē inferret. Solutio tamen ea nisi ad-
 modum augetur, non admodum propria solutio est: nō
 enim medici manu indiget adiutrice. Auicenna utranq;
 causam ex æquo ponit contra Galenum, eius tamen ra- sec. 2. pri.
 tiones sunt inefficaces. At non censuerim itcirco eum à
 Fuchsiō damnandum esse, quòd dixerit Galenum unam Defendit
tur Aui.
 tantum doloris causam posuisse. Nam si rem excutias
 Gal. id sentit, quòd eum sentire dixit Auicēna, hoc est
 quòd propinquior causa doloris solutio sit. sed Fuchsius
 nimis pro suo iure aliquando loquitur. Atqui mirū non
 est, quòd à Fuchsiō damnetur is, qui medicinæ lumen
 Galenum, quem assumpserat interpretandum uoluerit
 à seipso insimulare οὐτως γὰρ τῷ βαρβαρῶν τῶν ἰατρῶν
 λόγῳ. Non ignoro quàm in hoc loco Sophistæ & gar-
 riant & nugentur. Auerrous etiā contra Gal. utranq;
coll. 3.
cap. 31.
 causam

LEDESMA,

Secundo
secundum
locos. cap.
I.

causam ponit, solutionem tamen, nisi alterando non conciliare dolorem asseuerat, argumenta eius glacie frigidiiora sunt, nihilq; euincunt nisi apud Sophistas. Illud tamen ex omnibus autoribus, cuius notissimum est, sed ex Galeno præsertim, calorem & frigus dolores gigne re uehementes, siccitatem moderatos, humiditatē nullos, quatenus talem, at replendo, extendendoq; nonnunq; & dolorē & laboriosum progenerare, ut in Ascite. Pleuriticus enim dolor quū ob inflammationē adueniat, pulsans sanē esse debebat, nam partes inflammatae commouentur, & ab adiacente carne comprimuntur, partesq; uicinas sensiles percutientes, pulsant, ut Gal. ait. Proinde in suppuratione, augetur pulsatio, consequente nimirum uehementes inflammationes suppuratione. At uel laxo membro id impediēte, ut in peripneumonia, uel arterijs longē distantibus, ut in pleuritide, pulsatio non adest, quod si ad intercostales musculos pleuritis uergat, tunc aderit pulsatio, quoniam arteriosa pars est. Cæterum quum ex membri dispositione non naturali, uel ex humoris genere mixtionē ue contingat medicum aliquando falli, ut Gal. in sua colica, non immerito ipse idem scitē doloris differentias discutere ad eum pertinere sentit, qui eas sustulerit. Nec mirū sanē quod Archigenes improprias multas in medium attulerit, ut austeram, acerbam, astringentem, & alias.

Dean

De anhelitus difficultate.

Galenus lib. de Dyspnœa primo, & respirationis usu, anhelitum esse motū sentit ex inspiratione & expiratione compositum, inter quas, quum contrariæ sint, quietē mediā esse ex Arist. necesse est. Fitq; anhelitus à facultate animali uoluntaria non omnino libera, ut de motibus liquidis & de causis respirationis ostenditur, quod seruus Barbarus manifestè, retēto anhelitu uitam finiēns cōmonstrauit. Argumentū Auerrōt de dormientibus inefficax est, nam Gal. mensuram temporis illi facultatis animalis muneri ascribit, ut iniectioni & ejectioni. Quum igitur anhelitus hic à natura constitutus sit, tum ad cor euentandum, quin & ad spiritus progenerandos ex Hippo. sententia, inuita barbarie, tum etiā ad emittendas foras ustilagines, pro portione causæ huius uel illius maioris uel minoris, solent aliquando inter se uariari & differre inspirationes ab expirationibus, & cōtra, quod intelliges sequēti cap. de pulsu. Solet in hoc cōcentu inter symptomata alia accidere difficultas, quæ aduenit ob dolorem. nam quū dolor impedimentò sit, quo minus extendi pectus pro necessitate possit, fit anhelitus difficilis. Item aduenit ob obstructionem, quæ in partibus trachæ arteriæ, uel admodum uicinis fieri cōsueuit, ut in asthmaticis, & peripneumonicis. Nam si in longè distantibus fiat, tunc inæqualitas tantum in pulsu apparet, ut in Antipatro medico Gal. annotauit.

lib. de
Resp.de aff. 5.
cap. 9.

b

In apo

LEDESMA,

In apoplexia etiam difficultas inuenitur, ob interclusos spirituum meatus ad pectus tendentiū. Adhæc anhelitus difficilis fit propter inflammationes in uniuersum omnes, ut in phlegmonibus, & ardentibus febribus: aëre nimirum necessitati respondere non ualente, difficulter fit attractio. ob ulcus, suppurationem uel fit etiam huiusmodi difficultas, quum pulmo sese accommodato motu nequeat agitare atq; extendi, sanie impeditus. uiriū imbecillitas difficultatē etiam parit, ut Gal. si quid aliud doctissimè est prosecutus lib. de aff. lo. 4. ad quam partē lectorem ablegamus. Intra difficultatē ipsam quædam differentie aliæ ab ea nonnihil diuersæ, inueniuntur. im-

4. aph. 68 primis intercilio, seu offensio à Choo dicta in eo Apho. In febribus, spiritus offendens, malū. conuulsionē enim significant. nam fit conuulsis thoracis musculis, qui respirationem ullam absolutam peragere nequeant, præterea præfocatio, quæ in inflammatione cum angustia, & imbecillitate etiam, aliquando solet euenire, ut in peripneumonia. insuper inæqualitas, qualis in pulsu: motu nimirū ipso ob imbecillitatem, aut impedimentū aliud aliter incipiente aliterq; desinente. & licet in pleuritide possint ob suas causas nonnunquā contingentes aliæ differentie euenire, solum anhelitum appellamus difficilem, inflammationis nimirū & doloris tantum rationem habentes.

De pulsu ferratili.

Gale

Galenus lib. de Pulsibus ad tyrones cap. de pleuritidis pulsu. Simili modo inquit illa inæqualitatis species, quæ serrantis imaginem præbet, imprimis pleuritidis proprium est signum, si remissa est, mollis & probè maturanda, si uerò magna, difficilis, & admodum cruda. Tales cum imbecilla facultate coniunctæ periculum habent, si cum firmæ, aut tardè concoquantur, aut ad supurationem deflectent, aut tabidus eas excipiet marcor. Principio, pulsus serrantis inæqualis est. Inæqualis autem pulsus is dicitur, qui differentiam, quam primū sortitus est, non obseruat, ut si uelox ad tardum, uel magnus ad paruum uergat. Inæqualitas hæc duplex est, una nimirum pulsatione, aut multis: si in multis, aut deficiens, aut intercidens, aut decurtatus, aut deficiens decurtatus appellatur: si in una pulsatione, aut est in situ, ueluti in pulsu conuulsio, aut in motu, in quo spacio undosus, uermicularis, & formicans uagantur, & cum eis serrinus, qui talis dicitur, quoniam ob duritiæ pars arteriæ dilatatur, pars uerò minimè. Est igitur hæc pleuritidi propria inæqualitas serrantis, quoniam membro duro affecto, durus sit pulsus necesse est, atq; inæqualis, q̃ nequit equaliter arteria eo noīe distendi. Illud tamen est obiter animaduertendum ex Galeni placitis, inæqualem pulsum diuidi in ordinatū & eum qui caret ordine. Sic enim Galenus loquitur cap. de causis inordinati pulsus & ordinati. Proximum est ut de

2. de cau.
puls.

LEDESMA,

ordinatis & inordinatis agamus: Hi pulsus, quī inae-
 quales omnes sint, ut lib. de diff. pulsuum diximus, in eo
 tamen uariant, quod aequalitatē hi certis orbibus tuean-
 tur, illi confusi usquequaq; sint. Item de diff. pul. primo.
 Ordinati & inordinati pulsus sunt, diuisa sanē in pa-
 ritatem circuituū, & absolutam imparitatem inaequali-

Auicenna
 à Gal. dif-
 sentit fen.
 de puls.

tate. Auicenna uerò quum primū diuississet pulsū inae-
 qualem, in ordinatū, & non ordinatū, mox de pulsu na-
 turali agens: aliorum. inquit, qui neq; augmentū susci-
 piunt neq; diminutionem. naturalis est mediocris, & or-
 dinatus & boni ponderis. Quum Galenus lib. de dign.
 puls. cap. de opt. natura, moderatum esse dicat pulsū,
 ad quem alij collati excessuum & defectuū nominibus
 appellantur. Differt enim longē moderatus ab ordina-
 to, qui semper sine ulla exceptiōe inaequalis est, quicquid
 Forliuensiū, & extrauagantiū ἀμετρονὰ fingant & ἀγνα.
 Leuis igitur inaequalitas leue damnum significat, magna
 uerò, magnum. Quae si diutius perdurauerit, uirtutem
 perstare praesagies: at perstante ipsa inaequalitate, plus
 æquo, in suppurationem, aut marcorem perueniet, fietq;
 tunc, in principio nimis, magnus, uelox, & frequens: in
 augmento, durior, & uibratior: in uigore, cum eadem du-
 ritie minor fiet: in declinatiōe, ad naturalem sensim re-
 uertetur. Haec in suppuratione. In marcore autem pul-
 sus similis formicanti est, nullam mutationem suscipiens,
 unde Hecticus dictus, semper sui similis manens, impli-
 caturq;

aturq; ut initio cœpit, nunquam soluitur, totius corporis habitu in morbum cōuerso, & ægrotatē. Item paruus, creber, languidus, & Archigenis sententia *ἐπιτεταμένος*. Archigenes.
Galenus.
 Quæ latius inuenies apud Gal. lib. de puls. ad tyrones. Illud tamen memoria tenendum etiam obiter est, si spatium arteriæ metiamur, systolen diastole maiorem esse non posse, nec cōtra, proindeq; nullam in eo negotio inæqualitatem inueniri. Sed fingendum est arteriæ latitudinem a b c d e fore, extendiq; ualitudinis tempore & constringi ex b usq; ad d, & contra: sed maiori existente euētandi quàm expurgandi necessitate, ut in diæria, protendi ex naturali spacio usque ad e, per quod idem spaciū licet constringatur, non tamen systole æqualis erit ipsi diastole, quoniam nō mundificatur arteria plus quàm ualitudinis tempore, quum tamen plus euentetur naturalis calor eo tempore, quàm tempore sanitatis: si contra fiat, ut in tertiana, cōtra etiam dicendum est. Atq; in hunc modum in pulsu, thoracisq; anhelitu inæqualitas obseruanda, huius generis est.

De tussi pleuritica.

Tussis, symptoma necessariū pleuritidi est: secundo de dyspnœa. humecta autem uel sicca, salutē uerius aut mortem, quàm naturam morbi significat. Nam nisi materia per tracheam arteriam expurgetur, quum aliter non possit, suppurationem aut marcorem aduenire necesse est. Dolores inquit pleuriticorum ilico sua sponte

b 3 desit

Galenus.

de vict.
ac.

LEDESMA,

- desinunt, ubi aliquid effatu dignum tum expuere, tum
 expurgare cœperint, & Præ sag. lib. In omnibus, ait,
 2. com. 43 pulmonis costarumq; doloribus, ut sputum cito facileq;
 excreetur necesse est. Vnde suspectus multis eo nomine
 trac. 5. uisus est Auicenna, q; fen. 10. tert. Pleuriticorum cibos
 cap. 3. esse uelit lentes cum acetositate, quas præterquam quod
 ex Dioscoride, Hippocrate & Galeno ipso lib. 8. de sim
 plic. med. astringentes admodum esse comperiamus, tan
 tumq; absit, ut lenientes & pectorales dicantur. extat
 1. cõ. 27 Gal. locus lib. de uict. ac. eas apertissime damnians. Len
 tem, inquit, ex aceto confectam pleuritico, in ea morbi
 » declinatione, quæ nihil aliud quam coctorũ expuitionẽ
 Historia. exigebat, qui exhibuit medicus, nõ immeritò ægrotanti
 » ipsi, qui sequenti nocte suffocatus est, mortis occasio fuisse
 » uisus est: imò lenticulam nemo qui mentis cõpos fuerit,
 » dederit. Scio quid in hoc loco Sophistæ fingant, & quàm
 » extrauagetur Fulginas.

Aphorismi Choi pleuritici.

Imprimis sect. 1. Aph. 12. ex promptiore expuitione
 breuiorem morbum esse pronunciat Chous. Et quinto
 tertiæ, Aquilonẽ sua frigiditate pectoris materiam con
 densare. & eadem ferè ratione hyeme pleuritides fieri
 dixit. 23. tertiæ. Ad hæc. 8. quintæ suppurationẽ immũe
 re, nisi intra quatuordecim dies pleuritidis finiatur, quod
 nimirũ acuta ægritudo intra eos indicetur. Inde q; intra
 quadraginta si non expurgetur, tabem sequi, ut aph. 15.
 quintæ

quintæ habet. Quòd si ei alui profluuium superueniat, indicium esse proculdubio malum, præsertim uel non constante facultate, uel critico nõ existente profluuiio: quod asserit. 16. sextæ. Præfagit præterea acidum eructantes raro fieri pleuriticos, quòd rarissimè ex pituita pleuritis fiat, ex qua acidus ructus sæpe manat. Item si fiat permutatio ab ea ad pulmoniam, longè pessimū esse quis ignorat? ut dixit aph. II. septimæ. Hæc sub breui compendio, quæ notiora sunt. nam sexcentæ aliæ sunt sententiæ in lib. de uict. in ac. & Præfagiorum, & Prorethecorum.

De curatione pleuritidos.

Curationis ratio tam ad sex rerum nõ naturalium, quas uocant, peruestigationem spectat, quàm ad medicamentorum. Aër primū temperatus conuenientior est, calidior enim æquo morbum auget, frigidior crudiores reddit. Viæ rationem Galenus doctè lib. de uict. ac. explicat. tenuis enim esse debet, ut in Aphorismis primæ redditur apertissimum. at qualis futurus sanè is sit, uires nobis & morbi uehementia ostendent, & cum his sputi quantitas. si enim uel nil uel modicū expuatur, tenuius alendi languentes sunt: si uerò auctius fuerit sputum, & auctior esse uictus ratio debet. Ptisana cremorem, aut lac amygdalarum, aut utrunq; commixtum nunc soliti sumus præscribere, mox ad pullos gallinaceos pergimus, deinde peracta crisi ad lautiora

b 4 sensum



Jensem properamus. Frigidam nullo modo potent pleur
 tici, sed uel adianti, uel ordeï exactæ macerati decoctū,
 uel ut alij sentiunt, cynamomi, idq; tepidum: nam fri
 gidis morbus incrudescit. In latus affectum decumbere
 concoctioni adiumento est: mærorem, iramq; profligare,
 consilium. Reliqua nemini nō sunt notissima. Vnum ta
 men solum in hoc loco pertractabimus fusius aliquāto,
 cuius gratia commentariolus hic noster in lucem editus
 est. Nam quum ego is sim, qui primus Galeni manes ex
 citare, in lucemq; remeare, in nostro hoc gymnasio cōe
 gerim, asscribunt inepti nonnulli multa mihi, quæ falsa
 sunt, ut in seniorū fortassis odium incidam, nō inficiens
 interim nonnulla esse, quæ cōtra huiusmodi Sorticulas
 sophisticissimos de me quotidie malè meritos, & sentire
 & defendere non contremiscam. Controuersia est in
 ter autores, tum ueteres, tum recentiores, ex utra par
 te fieri debeat uenæ sectio in pleuritide, si eam fieri con
 ueniat. Nam ex Choi sententia, & Galeni etiam, pleu
 ritide admodum biliosa existente, uenæ sectioni super se
 dendum est, tum nimirū quum corpus macilentum fue
 rit, nullumq; plethoræ præbens indicium. Item ex eius
 dem Hippo. præcepto. 6. Epid. in cruenta expuitione ue
 næ sectionem prohibet his uerbis. Sunt nonnulli inter
 „ hos, qui sanguinem expuunt, quibus oportune uenam se
 „ care expedit, alijs autem perinde atq; illis haud decet,
 „ impedimento autē sunt, tempus, pleuritis & bilis. Quo
 in loco

lib. de
 Succis.

Sect. 3.
 aph. 32.

in loco sentit Hippocrates temperamentū biliosum uenæ sectionē, uel in sanguinis sputatione prohibere, tempus etiam biliosum non minus sanguinis missionem uitare: & quia cum his pleuritis coniuncta est, ea debet intelligi, quæ ad bilis naturam uergit: in qua quū iam ex se uenæ sectio non conueniat, longè minus cōueniet, si cruenti spūtamēti copia adsit, ubi, si uirtus & ex morbo & ex euacuatione imbecillis, multo ex uenæ sectione reddetur imbecillior, ut nihil interim dicam de impedimento, quod expuitioni pleuritidi necessaria, ipsa uenæ sectione inferetur. In quam sententiam Galenus uidetur uergere in commentario. Porro animus est nudas in medium asserre sententias, atq; candidè suis fulcire principijs, ut apertè intelligat unusquisq; quænam illarum firmiora iaciat fundamenta.

Pandite, igitur, nunc Heliconæ deæ, cantusq; mouete.

De uenæ sectione in pleuritide.



Quatuor ego in huiusmodi negocio sententias inuenio, quas suo proponam ordine, cum suis argumētis & rationibus. Quarum prima ea est, quæ celebrior esse perhibetur, quamq; maior medicorum uel doctissimorum pars in nostra usq; tempora sequuta est. Cuius duo tantum sunt axiomata. Alterū, quod in pleuritidis initio, fluente nimirum adhuc materia, corporeq; præsertim

b 5 pletho

LEDESMA,

plethorico, ex opposito brachio uena secanda fit, nempe ut fluxus compescatur. Alterum, quod materia coacervata, uel macilento corpore, ex lateris affectu brachio, quod iam morbi causa euacuatione indigeat, quæ per propinquiora fieri debet. Fulcitur huiusmodi sententia his, quæ sequuntur & autoritatibus & rationibus.

Hippo. Imprimis Hippo. lib. de hominis natura, post uenarum anatomen descriptam, sic ait. Sanguinem procul à locis, qui dolitant, & quibus sanguis cogitur, mittito. sic enim magna mutatio fiet repente, consuetumq; mutabis, ne illic coeat. Idem de natura ossium repetit.

Sec. 2. Rursus Hippo. 6. Epid. deriuare, inquit, & obsecundantia confestim reuellere: **aph. 30** Quam sententiam ipse met lib. de Succis exponit his uerbis. Reuelles quidem ad contraria, deriuabis uerò ad latus.

Archigenes præterea, in his, inquit, qui acuto morbo infestantur, siquidem circa mamam ac clauiculam hæreat dolor, uenam incidere oportet in brachio, non eo quod recta ab inflammato latere procedit, sed opposito.

cap. 6. Galenus meth. 4. Si perpetuum, inquit, est quod ab Hippocrate didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam esse, fixam uerò in laborante partícula uacuandam, quæ afficitur, uel à maximè uicina. In præptu nobis de sanguinis detractione colligere nunc est, quod in principio hæc è longinquo, postea ex ipsis exulceratis partibus emolienda. hæc ille.

Item

Item commentario. 68. quintæ Apho. illius nimirum
 aphorismi, Dolenti partem capitis. &c. Non solum, in=
 quit Studet Hippo. ubi sit opus, euacuare, sed cum auer=
 sione. Aversio enim, ad contraria fit.

Præterea tertio artis parvæ. Si enim totum corpus
 repletum fuerit, per ipsum affectū locum euacuare mi=
 nimè conuenit. Si enim incidendo, aut secando eviden=
 ter euacuemus inferentes dolorem, plus materiæ attra=
 hemus propter dolorem. Si uerò calefacientibus discu=
 tere aggrediamur, trahemus per calorē magis ad affe=
 ctam partem, quàm discutiamus. Quod si rursus libeat
 cogere, ut materia quæ fluxit, recurrat, corpus utpote
 plenum, nequaquam admittet. ut ergo hæc anibo fieri
 possint, totū corpus euacuare oportet, aut omnino auo=
 care ad locū alium materiam, quæ in partem affectam
 influit, &c. Celsus idē dixisse lib. 2. cap. 10. perhibetur.

Adhæc lib. de phlebot. Incipientes, inquit, inflam=
 mationes ad contraria reuelles, postmodum uerò ad ut=
 cina deriuabis.

Quin & S. methodi. Auertitur, inquit Galenus, in=
 flammatio, tum reuulsione ad contraria, tum deriuatio
 ne ad uicina: & eodem lib. Antispasis in his, quæ su=
 pra sunt omnibus, deorsum semper agitur: rursus, in
 his quæ sunt infra, præterea à dextris ad sinistra, si=
 cut rursus ab his ad illa. Similiter ab his quæ intus
 sunt, foras: contraq; ab his ad illa. Eandem repetit sen=
 tentiam

LEDESMA,

2. cap. 7. tentiam, lib. de reuulsione. & idem ferè lib. de febr. ad Glauconem.

Aëtius lib. 8. cap proprio, in Arabum apertè sententiam pedibus ire uidetur, illam Archigenis sententia fulciens.

Rationes Arabum.

Licet rationes uariæ inueniātur apud Montuū Turinum, Bracheliū, Agricolam, & alios huius farinae homines, omnes tamen facillimè diluuntur distinctiuncula quadam postmodum explicanda. Hæ tamen sequentes efficaciores inter alias sunt, nimirum quòd ex Hippo. & Gal. dictis nasci uideantur.

Imprimis si Chous procul à dolitante parte uenam secare iubet, reuellereq; si ad contraria, si fluxus compescendus est ex Galeno, si demū per affectam partem non est euacuandum plethorico existente corpore, non debet fieri sanguinis missio in pleuritide ex loci affecti brachio, quoniam in ea non obseruantur Choi, Archigenis, Galeni, & Aëtij sequentiumq; ferè omniū placita, sed antiquantur. Hæc est sylua communium argumentationum.

Deinde quum nullū censeatur inter superna & inferna discrimen, nō uidetur, cur, si laborante altero pede præcipiat Gal. 13. method. alterū scarificare, & nō idem sentiat in superno latere, sinistro nimirum, nempe quòd secetur ex dextro uena.

Adbæc

Adhæc quum nulla uis sit aut ratio efficax, quæ ponat discrimen inter pleuritidem & alias inflammaciones internas, & in alijs Galenus aliunde reuellit, alium de euacuat aut deriuat, ut in phrenitide: primum enim ex humeraria sanguinem mittit, mox ex uena frontis, atq; in angina primum ex humeraria directâ, deinde ex uena sub lingua, quod altera nimirum sit distantior, altera propinquior. sic in pleuritide fieri debere censendum est, ex uena prius distantiori, nimirum opposita, mox ex propinquiori, scilicet ex affecti lateris uena interna.

Item sacra Brissoti & reliquorum anchora relictu do est, ea quum ex æquo in utraq; interna brachij uena inueniri possit, manante nimirum ex eodem caudice, quod satis esse Galenus ad eam demonstrandam ostendit in commentario 36 sextæ. Difficultatē urinae uena secta soluit. Secare uero interiores. Secare, inquit, interiores paruam uim habet: ab una enim ambæ nascuntur, in poplite trifariam diuisa.

Præterea quum idem, quatenus idem est, uarios effectus producere nō possit, ex philosophorū sententiâ, quis audebit, uel mente uoluere, ex affectæ partis brachio fieri & auersionem & euacuationem & deriuationem, quum statim fateri cogatur, idem eiusdem respectu & distantius esse & propinquius?

Nec illud parua est efficaciam, reuulsoriâ uenæ frontis

LEDESMA,

vis sectionem, dolente parte posteriore, non per coniunges uenas fieri (quum nullæ sint, ex quibus per Galenistat pendet rectitudo) sed per solam auersionem, quæ inter anteriora & posteriora inuenitur, quum igitur in pleuritide dextri & sinistri auersio inueniatur, & totius quidem diametri secta uena brachij contrarij, nota est quòd affecta pars eligatur, præsertim quum adsit uena coniunx, caua nimirum, quæ & brachia & costas per suas uicarias nutrit.

Demum si dolores uariorum fuerint, ut ait Hippo. non est quòd dubitent, tum ob lateris dolorem, tum ob uacuum, uenæ sectionem eiusdem lateris sequens, maximè sanguinis defluxum, in plethorico corpore, in eam euenturum partem, quod sanè non accidet in aduersæ partis uenæ sectione, quum locus contrarius, & pars non dolens id non modo non concilient, sed impediant.

Scio apud Turinum & Bracheliū alias inueniri argumentationes, sed paruam eas uim ad Arabicæ sectæ demonstrationem faciendam obtinere, notius est quàm ut probatione indigeat, quum diuertant sepe homines hi ad parerga in suis obiectionibus: Cæterū allata hic ea sunt, quibus præsertim Mauritania magnam fidem adhibere solet. Atqui par est iam ad Galeni sectatores pergere.

Græcorum opinio.

Græci. Quis ignorat factionem Arabum numero imprimis
super

superare, sunt enim longe plures quam ad unum omnes, in nostra hæc usq; tempora scriptores axioma hoc sint amplexati: nisi uera sint, quæ audimus, Gallorū, Germanorum & Italicorum maiorem partem ad sequentem iam hæresim, palinodiū recantando, defecisse. Quis etiā nescit uiros hos, reliquos autoritate uel longissimō anteuertere intervallo. nemo enim est, si sapiat, qui canitiem atq; experimentorum annos acutis inueniū argutijs non præferat? Cæterum quum aduersa factio, tum se Galeni opinionem tenere arbitretur, tum se utrunq; expertam, quod Arabes non habent, mirum non est, si nō Platonem unum, sed uel sexcentos ueritati postponant. Est eius unū tantū axioma. In omni tempore, ætate, regione, corpore, ubi interna fuerit inflammatio, uena è directo affectu loci secanda est. Quoniam ea uenæ sectio, facta nimirum pro uergentia humorum inclinatione; ut ait Gal. in acu. uictu, præsentaneum uehemētis inflammationis discrimini remedium, quo maxime indiget, afferatur. Sed anteq̃ suū autoritatibus uallent axioma, & rationibus, nōnulla proponuntur animaduertenda, ex quibus totius hæreseos pendet demonstratio.

Primum, auersio genus est ad reuulsionem & deriuationem. Gal. S. meth. Auertitur enim atq; conuertitur ad alia membra sanguis, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, illum $\pi\alpha\rho\chi\epsilon\tau\iota\sigma\iota\varsigma$, hunc $\alpha\nu\alpha\rho\chi\epsilon\tau\iota\sigma\iota\varsigma$ uocāt. Quod nō negāt priores, $\pi\alpha\rho\chi\epsilon\tau\iota\sigma\iota\varsigma$

Sect. 2.
20. aph.

Cap. 3.

tamen

LEDESMA,

Ac. 2. tamen non æque atq; euacuationem nouerūt, quum Gal.
aph. 10 reuulsionem & euacuationē simul fieri fateatur: at isti
 per proprias se uocabula hæc aiunt distinguere signi-
 ficationes.

Deinde ἱεῖν Hippocratis inuentoris dictionem, un-
 de κατ' ἱεῖν, interpretantur, aiuntq; Choū ea fuisse pri-
 mum usum uarijs in locis, sed in omnibus rectitudinem
 uel directionem, uel rectū tramutem ex Galeni senten-
 tia intellexisse, nonnunquam uerò delationē significare.

Com. 29 Imprimis primo de ac. de ptisana loquens. Neq; in res-
 to, inquit, thoracis tramute manet, ἱεῖν eum uocant. Ga-
 lenus in Com. Hippocratem, ait, ut plurimum quidem
 ῥέθυρον, id est, rectum tramutem, interdum φορὰν, id
 est, delationē dicere non ignoramus. Item lib. de phleb.
 Gal. Omnibus, inquit, in confesso est, quod id κατ' ἱεῖν
 nominet, quod κατ' ῥέθυρον, id est, secundum rectum est,
 quum apertè ea uoce sæpenumero utatur in ea signifi-
 catione. Et de arte curatiua ad Glauc. κατ' ἱεῖν per κα-
 τ' ῥέθυρον, quod etiam secundum rectū est, exponit. Vti
lib. 2. tur non raro ea uoce Hippo. in Epid.

Postremò per ἱεῖν, ex Hippo. dictis, & Gal. interpre-
 tationibus, decursum quendam rectum intelligimus à
 parte in partem, inter quas familiaritas est per cōmu-
sect. 1. nes siue coniuges, quas uocat Gal. uenas. Hippo. enim
aph. 5. » Epid. 7. sect. 2. Fiunt, inquit, κατ' ἱεῖν dolores, præcor-
 » diorum distentiones, lienis tumores, sanguinis è nari-
 bus

bus profusiones, & anginae rubores, tantū ille. Nam si pleuritis in dextro fuerit latere, in dextrā claviculam, si per consensum migret, ascendet, nō autē in sinistram. Quod, idem Chous probat Epid. 6. de renis dolore loquens. Arenulae, inquit, subsident, cruentū mingūt, stu por etus cruris, sit quod κατ' ἴξιν est, hoc est è directo. Item quum distenditur pars praecordiorum dextra, ad dextram thoracis partē doloris consensus pervenit, & ad sinistram, si sinistra. ut liene uel iecimore inflammato, discrimina quærimus, quibus pleuritides ab horū membrorum inflammationibus distinguantur: quoniā κατ' ἴξιν ad superna migrat consensus. Finit præterea per directionem sanguinis eruptiones, nam laborante liene, per sinistram, hepate uerò, per dextram naris partem debet fieri commodè sanguinis emissio, ut postmodum uidebitur ex lib. de pbleb. Anginae demum rubores κατ' ἴξιν fiunt: experimento enim uidemus, dextra parte capitis laborāte sanguinis copia, nō adenas colli modo dextras rubere, sed & intumescere, sed & inflammari.

Illud tamen silentio non est prætereundum, Reuulsionem & derivationem, secum rectum hunc tramitem circumferre, ut Gal. lib. de pblebo. Porro, inquit, reuulsionis gratia, si uenam seces, uelociter in his quæ è directo sunt, conspicuam inuenies utilitatem. His procul dubio documentis suum habent axioma demonstratum uiri disertissimi: sed ut apertius longè ueritas pateat,

LEDESMA,

- loca tum Græcorum, tum Arabum, idem manifestè dicentium afferentur, & rationes cum non mediocri efficacia rem ipsam ostēdentes. Hippo. primū. 3. Epid. lo-
- » quens de Anaxione pleuritico. Octauo, inquit, die, ue-
- » nam secui in cubito, sanguis plurimus fluxit, & qualem
- » oportuit, dolores aliqua ex parte cessarunt, uerū tusses
- » sicæ adhuc subsequebātur. Sectam Anaxioni fuisse ue-
- nam è directo positam tam Græci quā Arabes faten-
- tur, illi quòd sentiant materiam ad octauum fuisse iam
- coacervatam, hi autem quòd semper sic fieri debeat. At
- quòd id tunc in principio sit factum Gal. 1. de Crit. testa-
- » tur, totum id tempus morbi principiū appellans, in quo
- » sputum nullū apparet. Anaxion enim nondū octauo die
- » quicquam expuerat. Tusses, inquit Hippo. sicæ subse-
- » quebantur. Eius. 2. de diffnœa, & Aph. 12. Gal. memi-
- » nit, prioriq; loco eum iuuenē fuisse ait, nec macilentum.
- Aph. 73. Hippo. item. 4. de uic. ac. Si dolor, inquit, sursum pe-
- netrauerit, uel clauiculam, uel mammam, uel brachium,
- uenam internam secare oportet, qua dolor afficit parte.
- » Quibus Gal. uerbis Sect. 2. decimū Aphorismū uic. ac.
- » exponit. Rursus ait in præsentī loco partis legitimæ
- » sententiam elaborat, quoniam in ea prætermissum est,
- » quod simul cū dictis intelligitur: adiicitq; illud, uenam
- » scilicet secādam recto, latere dolente, tramite. Quod ex-
- » ponit, dicens. Venam internam brachij secare oportet
- » qua dolor afficit parte. Sed manifesta usus breuitate

orationem negligentius percurrit. Quo dicto Gal. Hippocratis mentem & hic & ibi aperte explicat. Quòd si fortè sentiant Arabes has duas sententias in materia intelligi coaceruata, quis dabitur locus Galenico commentario, sic dicenti. Quum igitur superiorum condolentia fecerit signum, uenam in cubito eam secare oportet, quæ sanguinem ab affecta parte & magis & uelocius tum reuellere, tum uacuare possit. Reuulsio enim principijs ex omnium mente accommodata est, non autem finibus, aut statibus.

2. de ac.
aph. 10.

Hippo. etiam de morbis Lienarem ait uocatam uenam, uel iecorariam in manu secare oportet, quæ morbus uerget, sic pleuritis, & aliarum partium dolor lenitur. Lib. 1.

Si rursus hæc autoritas de collecta iam materia sit, dent locum in toto Hippocrate, qui ex contrario brachio, & non è directo posito secandam esse uenam iubeat. Quis obsecro dubitauit in materia coaceruata, unde mittendus esset sanguis? Quum tamè de principio controuersa sit? Porro de re certa loquutus toties Hippocrates, loquutus etiam erat, & apertius longè de re dubia. Sed huius nostræ rationis testis est Gal. Pro uergentia, dicens, inclinationemque humorum, qui inflammationem pariunt, uacuationes facit Hippocrates, nempe quod dicitur. Quò natura uergit per loca conferentia eò ducere. hæc ille. Sed quod & in reuulsione intelligantur uerba eiusdem loci paulò superius citata (reuellere, scilicet, simul &

2. ac.
com. 10.

”
”
”
”
”

LEDESMA,

evacuare) non probant modo, sed & demonstrant.

cap. 8. Gal. 13. meth. tractans de phlegmones curatione. Sati-
 tius, inquit, fuerit, ubi partes quæ in ore sunt, inflam-
 matione corripì cœperint, derivare ad nares, pari mo-
 do uenam quoq; ubi hæ partes sic affectæ fuerint, inci-
 dere humeralem in manu, & si ea non cernitur, mediâ.
 Vbi uerò iecur, pectus, pulmo, aut cor ita laborat, in-
 ternam. In angina autem primas in manibus, secundas
 eas, quæ sub lingua. At his quæ in occipite sunt affectis,
 etiam eam, quæ circa in cubito est, nec non eam quæ ha-
 betur in frôte. Renibus uerò, & uesica, pudendo, & ute-
 ro sic habentibus, eas quæ in cruribus sunt, potissimum
 autẽ quæ circa poplitem, sin minus eas, quæ iuxta mal-
 leolos. **PERPETVO ET IN OMNI-**
BVS, quæ è directo est. hæc Gal. Videant Sceptici di-
 ctionibus illis perpetuò, & in omnibus, omnia corpo-
 ra, temporaq; omnia Galenum complecti.

cap. de scul. Gale. etiam lib. de phleb. Quin & pleuriticis, in-
 quit, quæ è directo est laborantis lateris sanguinis mis-
 sio efficacissimam sæpe utilitatem attulit, ex opposita au-
 tem manu omnino obscuram, aut post temporis interual-
 lum. Quis amabo unquam materia coaceruata, uel ma-
 cro corpore (si sic intelligatur) uenam ex opposita par-
 te secuit uel Auicennicotatos?

Galenus quoq; in eodẽ lib. Sic efficax pròptumq; re-
 mediũ est, inquit, quæ è directo affectis partibus uenæ se-
 cantur,

tantur, afferunt: ut & qui patiuntur, & familiares ipsorum
 sæpenumero obstupeſcāt. Si de tempore, in quo omnes
 id faciunt, loqueretur Gal. nō erat quòd rem tanti
 faceret, præſertim quum ferè omnes ex oppoſita parte
 ſecti, ad decimūquartum diem imbecilles perueniant, è
 directa autem sæpe intra quatuor dies omnino liberentur,
 quod non raro ſumus experti, præſertim ſi primo
 ſtatim initio fiat. Reliquæ Galeni autoritates de direc-
 tione in uniuerſum capta intelliguntur, quæ poſtmo-
 dum afferentur, quū Arabū rationibus reſpondebimus.

Constantinus, qui uetus Hippocratis interpres di-
 ctus eſt, grauis ſanè autor, lib. 3. cap. 12. Si uideamus
 inquit, apoſtema in lateribus ſanguineum, ſi ſequa-
 tur tempus, ætas, & conſuetudo, & uirtus, feſtinemus
 ut de baſilica minuamus de latere ubi infirmus patitur;
 antequam augmentetur.

Conſtan-
 tinus.

Sed ut res uetuſtior uideatur quàm putant, Themio-
 ſon Aſclepiadis auditor, hieræq; ſimplicis inuentor me-
 ritò habitus, qui fuit multo ante Galenum & Andro-
 machum tēpore, ex affecta parte uenam ſecabat, quem
 eo nomine reprehēdit Cælius Aurelianus Theſſali im-
 pectiſſimi medici (ut Gal. sæpe in meth. teſtatur) imita-
 tor, Chronicōn lib. 2. cap. 1.

Themioſon

Cælius.

Alexander Trallianus, celeberrimus autor. Noli, inquit,
 reuellendi cauſa aliam q̄ ab affecta parte uenā ſecare.

lib. 1.
 cap. 4. 1.

Arabicis rationibus nunc locus eſſet reſpōdere, ſed

LEDESMA,

Fen. dec.
tert.
tract. 5.

quoniam illarū uis ex Galenica pendet rectitudine, ut ea cōtra Auicennā quippiam possit euincere, loca prius afferentur, in quibus ipse Arabs apertissimē directionē laudat. Auicenna cap. de pleuresi. Ex cōmunibus, inquit rebus est phlebotomia, sed in principio ex latere dī uerso, & magis festina de sophena opposita in longitudine, & post ipsam de basilica opposita in latitudine, & post ipsam de migra opposita in latitudine, si ea non appareat, fiat cephalicæ. Deinde post aliquot dies ex latere conueniēte in latitudine, & quandoq; etiam ponuntur uentosæ cum scarificatione super pectus, ad attrahendum materiam ad exteriora. Hæc ille. Vides ob directionem, internam malleoli uenam præponi uenæ brachij internæ oppositæ. Vt interim taceam plus quàm Milonicum corpus exigi ad tot sufferendas uenæ sectiones.

Fen. 14.
ser.

Item cap. de apost. iccinoris. Phlebotoma, inquit, in primis, & non hæsites in hoc, quum non est prohibitio fortis, & extrahe sanguinem abundantem. Et scias quòd tu indiges in initio eius, cuius simile est in canone de percussione, & infrigidatione, uerum tibi inest tunc ut attēdas latus duritiei, ò quàm uelociter respondet duritiei. Ad hæc, In præfocatione nimirū uulue, & oportet, ait, ut fiat phlebotomia ex basilica partis quæ sequitur declinationem matricis. Si autem non declinat ad latus, imò cōtrahitur ad superiora, tūc ibi superest

a. 21.
tert. tra.
4. cap. 15

perest, ut phlebotomes quamcumq; duarum uis, aut ambas. En rectitudinem.

Item fen. 22. tert. Et scias quòd phlebotomia sciati Trac. 2.
 & uenæ magis est iuuatua in sciatica quàm in sophe- cap. 25.
 na plurimum, nisi sit dolor leuior extensus in syluestri,
 imò sit purus rubeus, cuius tensio est ex domestico, quia
 erit sophena magis conferens ei, q̃ uena sciatica, quam-
 uis ambæ sint duo rami uenæ uniús sicut basilica & ce-
 phalica in manibus. Vbinam apud Galenum clarior di-
 rectio quàm apud hunc, licet hæc sententia non admo-
 dum quadret cum Galeni com. 36. sextæ Apho.

Demum fen. 4. pri. Quandoq; oportet habere solli cap. 1.
 citudinem loci & societatis, & in eo quum tota materia
 est euacuata, & quū euacuatur adhuc & est in descen-
 su cum quatuor conditionibus materiam extrahemus.
 Prima, diuersitas est partis. Secunda, societatis. Ter-
 tia, rectitudinis, ut in ægitudinibus hepatis ex dextra
 minutionē facimus, in ægitudinibus splenis, ex sinistra.
 Quarta, elongationis ne per ualde propinquum, extra-
 hatur membrum. Qui in his, Hippocratis ἔξις, & Ga-
 leni ὑποσφίς esse negauerit, cum sensu communi care-
 re non negabimus. Video iam Sophistas hæc irridentes,
 at Diogenis dicto respondemus, nos, licet irrideant in-
 cepti, non irrideri.

RATIONES GRAECORVM

Si Arabum princeps directionem agnoscit, Galenū

LEDESMA,

Sequitur, in fectoris inflammatione, suffocatione uterique
coxendicis dolore, & morbis alijs, eandem in pleuritide
de agnoscat necesse est. Quod si eam in alijs morbis ma-
teria coaceruata obseruandam intelligant, dent locum
Auiennae id in illis asserentis, quum in pleuritide aper-
te tempora distinguat, alioqui aut cum mutilū, aut nō
in omnibus circumspectum esse fatebimur, si nulla exis-
tente discriminis ratione hic directionem excretur,
illic amet.

Rationem exigunt Graeci quare magis festinum re-
medium ex Auienna est, malleoli interni uenam secare,
quā brachij oppositi. Si respondeant, quod Medicorū
uulgus ex Mesues autoritate solet, nimirū quod in ple-
thora moderata ex opposito brachio, in immoderata au-
tem, ut in Milonica ex interna malleoli fieri debeat.

Respondeant rursus cur in Milonica erit ex pede
magis festinum, quā ex brachio, & in mediocri cōtra?
Negare non possunt, quin illud prius reſtitudo pariat,
uel nostrae percontationi faciant satis, modo ne ἄρεος, ut
solent, ἀρεῶσι.

Præterea nulla efficax ratio est, quæ Arabes cogat
reuulsionē ex opposito brachio facere, nisi ea forsan sit,
distare nimirū eam partem à loco affecto longē magis,
quā ē directo positam, quæ distantia necessaria quī-
dem est in principio, non ex Auienna modo, sed ex ipso
eodem Galeno. At si mathematica demonstratione di-
stare

stare ex æquo illas duas uenas à loco dolente probemus, non referet ex hac uel illa uenam secare. Sit schema tale, ubi c b f uena caua est, parti utriq; communis, b a uena nutriens costas, a pars affecta. Deinde rem sic demonstro b c e spaciū, æquale est illi, b c d ,



quum duæ internæ brachij uenæ à cōmuni caudice nempe c b f manent, & per simile spaciū æqualisq; longitudinis nimirum brachium utrunq; diffundantur, sunt igitur æquales. Quod agnouerunt Nicolus & Gordosnius. Item b a uenula costam nutriens, atq; ad inflammationem perueniens, & cum ea reliquæ uenule, quas tibi adesse communiscuntur, communes sunt parti utriq;. Nam si b a spaciū iungatur b c e spacio, fiet spaciū a b c e , æquale nimirum illi, a b c d , utrunq; enim ab eadem radice nempe ab a originem habet, desinitq; in e uel d æqualiter distantes à caudice caue uenas, si enim æqualibus commune quippiam addas, æqualitas non uariabitur.

Ad hæc omnibus cōmune est humore coaceruato secare è directo uenam. At in principio pleuritidis, licet ad inflammationis locum nondum materia fluxit, fluxit tamen magna ex parte & copiose quidem, ad inflammationis latus. Nam Gal. de Tum. præter nat. & de in. æq. intemp. & 3. technes docet in inflammationibus à uenis

cap. 115.

c 5

prius

LEDESMA,

prius magnis ad minores fieri humorū fluxus, donec ad eas perveniat, quæ sensum antea latebant, & inde humores, uasis non potentibus cōtinere, diffiūit efficiuntq; abscessum. Si igitur ad uicina prius, quàm ad affectum locum humor fluit, quū secabis uenas, à directione non recedendum est, quoniam materia iam fluxit licet nō ad inflammationem, ad latus tamen.

2. de ac.
10. Item si distantior locus eligendus ad phlebotomiam est, hoc quidem fit, quòd promptius remedium pleuritidi euacuatione simul & reuulsione cita, quam Gal. extigit, afferri uideatur, at id quidem ex contrario brachio non sequitur, quū sæpius ad id conspiciamus humore trahi uenæ sectione non euacuatum sed reuulsum, & à dextro ad sinistrum pleuritidem commutari, & contra quod non raro uidi, & Brissotus sæpius sibi contigisse testatur.

Quòd si experientia quicq; ualeat, non semel presentibus nostris discipulis partis affectæ cubitū in principio secimus, quum ante horæ dimidiū fuisset ex aduersa parte alterius præcepto uena secta, ex qua sanguis fluxerat aut incorruptus, aut nō admodū infectus, quum noster, obstupeſcētibus omnibus à pure nihil differret. Hoc enim efficacius remedium esse directionem adeò probat, ut & demonstret.

Curtij collationem à Turino nō intellectam nō gra uabor schemate enarrare, ut intelligatur, sit fons a quo

quo duo riuuli b & c à dextra & sinistra parte fontis manēt, sintq; e & d loca uicina & directa riuulo dextro & sinistro, quis tūc ignorat citius aquā refluere b riuuli, in fontem a, per d, si excauetur, sinaturq; aqua per eam partem fluere quā per e, & contra, si contra fiat? Vena caua fons est, b & c uenæ nutriendes costas, d & e internæ brachiorum. Vim aliorum argumentorum inuenies in prima pro Græcorum parte:ratione.



Vt iam sub epilogo omnia complectar, quatuor sunt euacuationis modi, primus ἀνάσσις siue reuulsio, quæ fluxury conuenit humori, aut fluere incipienti. Secundus ἀποχρῆσις, siue deriuatio, de qua Gal. 6. Epid. Deriuationem, inquit, appellare consuevit Hippo. quū humor aliquis uacuatione indigens, neq; per cōuenientem locum fieri cæperit, neque ualde procul à conueniente, neque ad remotissimū. hæc ille. Conuenit deriuatio, ubi humor partē obsedit. Tertius, ex ipsamet particula euacuat, qui fit malo inueterato. Quartus, reuellit simul & deriuat, fitq; quum humoris pars adhuc fluit, pars tamen iam locum infestat. In præcautione, ubi primus uacuationis conuenit modus, uenæ sectio à loco distantissimo fieri potest, quod aliquādo præcepit Galenus, ut ex pede, præsertim si ex mensiū aut hæmorrhoidū suppressione annis nonnullis pleuritis soleat infestare. Sed quod & in ea (nam in reliquis sole clarius est) sit rectitudo

Sec. 2.
com. 3.

LEDESMA,

tudo animaduertenda, Paulus Aegyneta lib. 3. cap. de
lien's morbis, per ἀντίστασις, ut ipsemet ait, id est, re-
uulsionem, in inflammatione lien's uenam secat brachiū
ē directo positi. Aut enim Paulū illum, quem toties Aui-
cenna citat, errasse dicendum est, aut diuerso, quam uo-
cant, ex eiusdem partis brachio fieri potest, ac debet.

Dilutiones Arabicarum argumentationum.

His absolutis par est iam Arabibus ipsis satisfacere, ne arbitrentur Græcis doctas obiectionū dilutiones deesse. Imprimis Hippo. ibi, ut uidere est, sole clarius, agit de præcautione, non autem de morbi re infestantis curatione, solentibus namq; laborare pedibus, ex brachijs, & contra brachijs, sanguinem ex pedibus soliti sumus reuellere, ne ad partes humor refuat, ad quas de more solitus est. At faciendum aliter est, quum iam dolore laborant, etiam si laborare incipiant, licet Gal. ex contrario loco uenam secet, semper Hippocraticam & præcipit obseruandam. Quod etiam responsum uolumus sequenti etiam Chol. autoritati in Epid. & Galeno ipsi. 5. methodi, ibi enim oppositio obseruatur, nam ab internis ad externa trahitur sanguis. Item ab inferioribus ad superiora. Quin & si Manardū audiamus, recti & sinistri rationem inueniemus. Quod si delicatissimo cuiuspiam hæc non placuerit ratio, placeat mathematica superius allata demonstratio, quæ quum utrumq; brachiū æquè ab affecto latere distare probet, in utro

uis secetur uena, procul à dolitante membro fieri sanguinis missionem intelliget. Quod si statim Galenus idem obtruditur 4. metho. quòd ex longinquo primum præcipiat fieri uenæ sectionem, mox ex ulceratis partibus: respondeat ipsemet Auicenna, cap. proprio, quì cucurbitas loco affecto aliquando admonet, id sanè erit ex ulcerata parte euacuare, quì res exigat, alioqui seruabimus nostram cum rectitudine oppositionem. Quæ responsione, et quintæ cõmentario. 68. et lib. de pbleb. puto satisfactum. quum ad contraria fiat nostra reuulsio, sed uer' it'p. Sic intelligendus Celsus. Oculum oppositione non agnoscunt Arabes in uena brachij directi.

Illud Artis parue *ῥιζὴ ζῶντος*. Non enim ex affecta parte secatur uena, sed ex brachio ab affecta parte admodum distante. Ibi enim Gal. exemplum oculi affert inflammati, ubi quum possit fieri sanguinis missio, uel ex uena frontis, uel ex ipsis affectis palpebris, è distantioribus prius uenis nempe ex brachiorum internis fieri doctè præcipit, mox ex propinquiore: sed argumentationem hanc è medijs natam Gentilis Extrauagantibus dixeris.

Locus ille. S. meth. ubi de reuulsionum differentiis agit Gal. nihil contra Græcos facit, quum non semper ubi ægritudo in dextra parte est, debeat ad sinistram fieri reuulsio. Sat enim est fluente materia, fieri ad contrarium reuulsionem, unam quidem illam ex multis, sicq;
in plen

LEDESMA,

in pleuritide fit reuulsio, ut dictum est in prima dilu-
tione.

Archigenes nō magni est faciendus, præsertim in re-
bus apertissimis lapsus, ut Gal. in lib. de locis aff. & se-
cundum locos sæpe testatur. De Aëtio Syro hoīe, mul-
toq; post Gal. tempora scribente, quid mirum quod ad
aliorum opinionē diuerterit, nec id quidem ubiq; quum
alibi Arabs uideatur, alibi uerò ueluti in hac re dubius
reclititudinem Galenicam obseruari iubeat.

His responsionibus, & rationi primæ Arabum sa-
tisfactum arbitror, quæ nimirum ex quatuor grauissi-
morum autorum pendebat autoritatibus.

Quod autem obijcitur mox, de superiorum & infe-
riorum collatione, differunt maximè inter se inflamma-
tiones externæ & internæ, non enim est eadem ratio
pedis inflammati & internæ costæ. Quin & scarifi-
cationis, & phlebotomiæ diuersa est consideratio, non
sanè tam exactam reclititudinis curam in scarificati-
bus querimus. hic Turini Achilles pelia caret, q. & si
iis exigatur, filamentorū anatome inspecta, inuenietur.

Illud de pleuritide collata reliquis inflamationibus
paruam uim habet, nam in alijs locus est distantior, &
propinquior, ut ratio proponit. In pleuritide autē bra-
chijs æquè distantibus à patiēte membro, ubi uena pro-
pinquior, ubi distantior?

Brissotus
Græcorū

Ad Brissoticæ directionis antiquationem. 36. cōmen-
tario

tario sectionis sextæ uallatam, non difficulter responde-
 ri potest, si dextras parteis cum dextris commerciū ha-
 bere ex Galeno ipso intellexerimus, & sinistras cum si-

partes feri-
 ptis pub-
 licauit pri-
 mus.

nistris. Age quum ex iecore solo, non autem ex liene ad
 superiora per cauam tendat sanguis, cur Gal. has duas
 sequentes protulit sententias? Tercio de Crisibus. Sol-
 uit, inquit, sufficienter lienis & iecinoris inflammatio
 nes sanguinis è naribus profluuium, quum hæc uiscera
 una cum acutis febribus habent inflammationes. Et om-
 nes quæ sub præcordijs sunt inflammationes acutæ &
 calidæ fluxu sanguinis nariū finiuntur, iudicantur'ue.
 Oportet autem per directum sanguinem fluere, ex dex-
 tra quidem nare, iecinore affecto, & locis sub dextro
 præcordio positis, ex sinistra uerò nare, liene, & locis
 quæ in ea parte sunt affectis. Item lib. de pbleb. Qui-
 buscunq;, inquit, eruptio sanguinis secundum rectitudi-
 nem accidit, summum commodum egrotantibus affert.
 Quod autem uer' & pro eo quod est secundum rectū
 dicit, omnibus in confesso est, quum apertè hac uoce se-
 penumero utatur in hoc significato. Quibus uerò con-
 tra erumpit sanguis, nihil iuuat, aut interdum nocet,
 quod scilicet uires citra morbi leuamen deiiciat, atque
 exoluat. Non enim in liene ex dextera nare erumpens
 sanguis, nec in iecore ex sinistra aliquam affert utilita-
 tem, sed reuulsio in directum adhibita euidentem utili-
 tatem celeriter ostendit, quæ autem contra nequaquam.

Cap. 4. atq;

Dextra

LEDESMA,

„ Dextra igitur nare sanguinem erumpente, ad dextrum
 „ præcordium fixa cucurbitula clarè celeriterq; sistit, si-
 „ cut ad sinistrum, è sinistra, tantū Gal. Caua uena utriq;
 parti est & supernæ & infernæ cōmunis, atq; una so-
 la, quæ in dextras & sinistras parteis diuaticatur, nec
 alia è liene prodit. At uides quā se mutuò partes cor-
 poris respiciant, dextræ scilicet dextras, & sinistræ
 sinistras. Quod non mediocri animaduersione indiget,
 nec parum ad huiusmodi ratiociniū facit capillamenta
 uenarū & arteriarū fibras mente uoluere. Sunt enim
 fibræ uasa contexta, rectis nimirum quibus attrahunt,
 transuersis, quibus excernūt. Fibræ siquidem appellan-
 tur partes tenacioris solidæq; substantiæ oblongæ, fi-
 lisq; persimiles.

Fibræ.

Philosophorū axioma, idem quatenus idem, uarios
 nō posse effectus producere, nō est quòd Græcorū amo-
 liatur sententiam, uidemus enim ex remotione causæ re-
 moueri etiam non modo morbos, sed & symptomata ex
 eo sequentia, non enim in Græcos quicquam facit axio-
 matis istius sensus. Dicimus ergo ex Galeni mente se-
 ctionem uenæ brachij affecti lateris, esse auersiuam &
 euacuatiuam, & quodammodo deriuatiuam, quum pro-
 pinquior nō detur locus ex quo sanguis mittatur. Qua-
 tenus nanq; locus non maximè distat, dicetur deriuati-
 tio, quatenus ad contraria, reuulsio, quatenus ab affe-
 cta parte euacuat, euacuatio. Cernant, quā Turin

Hector

Hector, ut Troianus ille, bigis raptetur.

Non negamus à fronte ad occiput uenā nullam magnam permeare, quæ utranq; partē nutriat, licet multæ inueniantur minutissimæ, quæ tum hinc inde prodeūtes caput intertexant, tum etiam à iugularibus euacuantes cōmunibus quidem illis, toto capiti (licet per dextra & sinistra) magnā sanguinis quantitatē ad cōtrariū uerge re, sic sectæ, faciūt: quæ rectitudo nō parui est momenti.

Loci distantiam æqualem esse diximus, & auersionem Galenicam simul inueniri, & quemadmodum dolor attrahit, sic per uenæ sectionem sanguis euacuatur, uel in pleno corpore. Quod postremæ argumentationi facit satis, illud est, locum utrumq; æquē contrariū esse affectæ parti, quo nomine non maiorem fieri hinc uel inde ad locum attractionem: sed ñq; maiorem, promptiorem curam progenerare.

Græcorum factio adeò inualuit nostro iam sæculo, ut uel seniorum grauiorumq; medicorū pbalange, illius antiquationem pertinaciter postulante, decreto sancitū sit, ut unusquisq; pro autorum suorū & sententijs, & arbitrio uenam secet. sanè acutis uallata hæc est ratio nibus & autoritatibus, dictisq; Hippo. & Galeni similior, quum altera superficiariam uideatur habere euidentiam. nec negat interim Græcia, dari corpus in quo uena è directo nullo modo secari debeat, nimirum brachio in ea parte deficiente, uel uenis brachij.

LEDESMA,

Tertia
opinio.

ANDREAS autem Vuesalius, uir quidem de re medica bene meritus, nouam excogitauit sectam, secandam esse nimirū uenam internam brachij è directo positi, inflammata aliqua quatuor supernarum costarū, iuxta Græcorū sententiam. Quacunq; uerò octo infernarum semper internā dextram, quod hæ ex uena azygo, à dextra uenæ cauæ parte prodeunte, nutriantur, unde directiorem esse locū semper dextram axillarem utriq; tali pleuritidi, quàm sinistram.

Non negarim acutè eum rectitudinem excogitasse, sed non admodum uerè, nam si in superioribus seruanda dicta igitur est, non uideo cur & in inferioribus non debeat eadem obseruari. In primis dextræ partes, ut diximus, cum dextris commercium habent. Deinde sanguis ab azygo in cauam remeat, neutri parti directior, aut propinquior. Postremò azygos ipsa à medio non magis distat, quàm eius occupare potest latitudo, quod ferè nullius momenti spacium est, nempe unius mediocris ueniculæ. Adde sentire nos, nō magis distare axillarem sinistram à damno laborāte dextra parte, q̃ laborāte sinistra, nam usq; ad azygæ uenæ initiū æqualia sunt spacia, ut ostendimus, reliqua autē oīa cōmunia. Quia & propinquitatem Gal. nō tanti uisus est facere, quàm directum aspectum, nam deficiente axillari mediam uel humeralem eiusdem partis secari iubet. Scimus enim & aduersam axillarem propinquiorem esse affecto loco quàm

de ac.
10.

quàm humerariam eiusdem partis. oriuntur siquidem ambæ axillares ex uena caua, priusquam in iugulares diuidatur, humerales uerò, postquam in iugulares est diuisa.

In hanc sententiam pedibus nuper apertissimè ire uisus est Fuchsius, uir nostra ætate & doctissimus & disertissimus, in cōmentario de uenæ sectione, quū tamen huius negocij nullam antea fecisset apertam mentionem. Porro res tam necessaria, tamq̃ animaduertenda, non erat à Galeno silentio prætereunda, & Hippocrates haud dubiè errasset. 4. de ratione uic. ac. absolutè docens fieri debere uenæ sectionem in pleuritide, qua dolor afficit parte, non iudicans rectitudinis huius obseruationem, nec idcirco inuichimus mathematicam diametralem'ue Arabum directionem, sed naturalem, quam secundum fibras & filamenta uenarum arteriarumq̃ Hippocrates intellexit, quin & Galeni dictū 13 Meth. de scarificatione pedis aduersi aliàs aliter quàm nunc, hanc opinionem sequutus interpretabatur Fuchsius.

Quòd si dicat Vuesalius hæc omnia nihili apud eum esse, sed tantum filamentorum & fibrarum a Zyga rectitudinem esse animaduertendam, quis ignorat a Zygon secari in partes dextras & sinistras, ænulasq̃ ex ea dimanantes, suas fibras uersus partes ad quas tendunt directas habere, quæ non magis dextrum latus respiciunt quàm sinistrum. Item quis dubitat uenam

d 2 ipsam

LEDESMA,

ipsam a Zygon fibras habere suas nō magis ad dexterās partes quā sinistras tendentes, sed ex æquo, ut & uenam cauiam, quo nomine dextræ fibræ dextrū brachiū, sinistræ uerò sinistrum respiciunt.

Quarta
opinio.

2. vic.
ac. 17.

Sunt nonnulli, qui contra Græcos ipsos Arabesque sentiunt. Aiunt enim in phlethorico corpore sanguinem mitti ex affecta parte debere, in macilento bilioso uē ex aduersa, idē sic probant. Præcipit Hippocrates sanguinem fluere sinendum, donec à nigro in rubrum, aut à rubro in nigrum conuertatur, quod quidem fit, quoniam sanguis antea crudus, morbo utpote ex calfactus rubicundior fit aut flauior, qui si talis fuerit, in nigrū adustione conuertitur. Atq; ut morbi materia uel eius maior pars extrahatur, par est ut ad flauitiem, nempe ad supercalfactionem, uel ad nigredinē, hoc est ad adustionem, quam facile extirpemus, perueniamus. at id macilentorum natura ferre nō potest, fiet igitur ex aduersa parte, ex qua fieri non est necessarium, quod uellem Manardus ostendisset, qui in hanc sententiam partes Arabū quodam modo defendens, deflexit. Age obsecro non iubet Galenus aliquando ad animi usque deflectionem sanguinem mittere, aliquando autem languentis utribus expensis parcius agere? Nonne de sanguinis missione copiosa uel moderata, sed de ipsa simpliciter sanguinis missione Hippocrates in acutis morbis, inquit, sanguinē detrahes, si uehemens morbus uideatur, florueritq;

a. vic.
ac. 17.

ritq; ægrotanti ætas, & uirum fuerit robur? Sed ad rem magis Gal. lib. de phleb. Multum, inquit, iuuat lie- nem afflictu sanguinis ex sinistra manu detractio, Præ- stat tamen non semel quantum conuenit extraxisse, sed id in duos dies partiri satius est & inferius paulo. Præ- stat nisi quid urgeat, priori missioni prius detrahere, iterumq; eam repetere, imò si libet, tertio. Quod si hæc satis nō faciant, faciet illud forsā. Quum interdū uir- tus tantum uacuare prohibeat, parti ipsi, quæ phlegmo- ne obfessa est, munus quidem auxiliū futurum scire oportet. Quo fit ut non uirtutem exoluere melius sit, quā sanguinem uacuare redundantem. Hæc Gal. de pleur- tide loquens. 2. ac. 10

VENA secta, tum iuxta robur languentis, tum morbi uim, Clyster statim aluo infunditur levis, si non, ut conuenit, sua sponte deiciat. Ante uenæ autē sectio- nem, graues autores nullam clysteris fecerunt mentio- nem, sed post: cōtrā uerò sæpe sæpius fieri hodie uideo. Quin & euacuationem, quæ pharmaco fieri solet, præ- ter Cōi sententiam damnauit Gal. licet dolor ad infe- riora declinet, metuens nimirum, autore Paulo, alui conturbationem. Quod si forsā quispiam id pertinaci- ter facere uoluerit, non id prius uel lenientibus medica- mentis, ut cassia & manna, quam uocant, & id genus alijs tentet, quā pectoris materiam prius expulsionī reddat aptissimam, quod fiet rebus sputi excreationem
d 3 facilem

LEDESMA,

Spusi edu-
ctionē faci-
lem redi-
dentia.

Commune
nisi lapsus.

Ecligma
ta.

Fomenta.

Empla-
stra.


facilem reddentibus, ut sunt adianti, uio larū, & nym-
phae serapia, diapentidion, diatraga cathae frigida, sac-
carum uiolacum, trochisci pectorales, bechicae pillulae,
& ecligmata, quae omnia tenues serofos atq; acres humo-
res, crassiores & proinde exitui aptiores reddant. Haec
sola praeparatio bilis in pectoris affectibus exigitur: in
alijs autem locis admodum, contra multorum sententiam,
atq; adeo ipsius Auicennae in Rasem placita, superuaca-
nea est. Humor enim biliosus in solo pectore in crassatio-
ne indiget, & maiori, quod maior in eo fuerit serofitas.
Quod si in frigido uel senili corpore pcuritis adue-
nit, aliquanto conueniunt calidiora, sed cum illis mixta
superioribus. Ea sunt succus glycyrrhizae, sirapiūq; eius-
dem, ecligma quod sanum uocant, quod cum prassij aut
hyssopi serapijs, uel cum oxymelite simplici, composito,
uel scillitico, pro maiori uel minori materiae crassitie
accommodatissimum est. Forinsecus post corporis ua-
cuationem fomenta adhibenda sunt, ut sacculi ex flori-
bus chamemeli, anethi, meliloti, plomi (taxum bar-
batum dicunt) seminibus lini, & fenigræci, nilio, &
furfure constructi. Conueniunt etiam uasa aenea ex ho-
rum decocto plena, aut spongia in dictis rebus intin-
cta. Quae omnia in initio non adhibentur, nisi tenta-
dis, ut aiunt, aut discutiendi, si leuis causa fuerit, gratia.
Ad rem eandem faciunt emplastra ex farina hordei,
fenigræci & seminis lini, oleis que liliaceo, & chamæ-
melino.

melino. Sunt qui ad cucurbitulas cum scarificatione mi-
 grent post dies aliquot, adhuc dolore perstante, sed non
 nisi quum humor ad externos cutis musculos repere ui-
 detur. Pectus ungi solet oleis liliorum alborum, amyg-
 dalarum dulcium, & chamæmelino, ut humor etiam
 facilius præparatus foras mittatur. Cerata ad eandem
 indicationem ex filio Zachariæ, & diachylôn magno
 sunt quæ construuntur. Hæc de uera pleuritide.
 Notha autem calorificis fomentis & dignoscitur &
 curatur.

Cucur-
bitæ.Linimen
ta.

ERRATA.

Fol. 2. fo. 2. li. 2. pendit, lege pendet. fo. 3. fa. 2. li. 23. inflam-
 mationum verò tumores, lege tumorū verò inflammationes.
 fo. 4. li. 7. errauit, lege citauit. fo. 9. li. 11. iniectioni, lege mix-
 tioni. fo. 9. fa. 2. li. 15. significant, lege signant. fo. 10. fa. 2. li.
 7. in margine. Fen de pul. lege doct.



PLEVRITIDIS AD CHIRVR-

gum, Epigramma, per autorem ipsum.

Pungo latus fateor, sed tu quoq; brachia pungis,
Quod si nostra dolet punctio, nónne tua?
Quum tu præterea uitam cum sanguine perdas,
Dic, homines, quàm tu, cur magis ipsa neco?

